



Cephazolin Fresenius® 2g

Cephalosporin – Breitspektrumantibiotikum zur Injektion; Humanpräparat

Zusammensetzung

Jede Durchstechflasche enthält:

Wirkstoff:

2,096 g Cephazolin-Natrium (entspr. 2,0 g Cephazolin)

Darreichungsform und Inhalt

Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung.

Packungen zu 10 x 2g Pulver in 15 ml Durchstechflaschen.

Anwendungsgebiete

Akute und chronische bakterielle Infektionen unterschiedlicher Lokalisation und Intensität mit Cephazolin-empfindlichen Keimen wie: Infektionen der Atemwege; Infektionen der Niere, der ableitenden Harnwege und der Geschlechtsorgane; Infektionen der Haut und Weichteile; Infektionen der Gallenwege; Infektionen der Knochen und Gelenke; Sepsis; Endokarditis; perioperative Prophylaxe bei infektionsgefährdeten Operationen.

Die allgemein anerkannten Richtlinien für den angemessenen Gebrauch von antimikrobiellen Wirkstoffen sind bei der Anwendung von Cephazolin zu berücksichtigen.

Gegenanzeigen

Cephazolin Fresenius 2 g darf nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegen Cephazolin, andere Cephalosporine oder einen der anderen Bestandteile des Arzneimittels, da die Gefahr eines anaphylaktischen Schocks besteht.

Frühere Soforttyp- und/oder schwerwiegende Überempfindlichkeitsreaktionen gegen ein Penicillin oder ein anderes β -Lactam-Antibiotikum.

Cephazolin Fresenius 2 g darf Frühgeborenen und Säuglingen im ersten Lebensmonat nicht gegeben werden, da hierfür bisher keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen.

Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Angaben in der Gebrauchsinformation.