



Sucrabet® 1 g Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen

Sucrabet® 1 g Tabletten

Ulcustherapeutikum; Humanpräparat

Zusammensetzung

Sucrabet, Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen

1 Beutel mit 1,45 g Granulat enthält:

Wirkstoff:

Sucralfat 1000 mg (entsprechend 190 mg Aluminium)

Sucrabet, Tabletten

1 Tablette enthält:

Wirkstoff:

Sucralfat 1000 mg (entsprechend 190 mg Aluminium)

Darreichungsform und Inhalt

Sucrabet, Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen ist ein feines, weißes Pulver.

Sucrabet, Tabletten sind runde, weiße Tabletten.

Packung mit 50 oder 100 Beuteln.

Packung mit 50 oder 100 Tabletten (100 Tabletten als 2 x 50 Tabletten-Bündelpackung)

Anwendungsgebiete

Zur Behandlung des Magen- und Zwölffingerdarmgeschwürs (Ulcus ventriculi et duodeni).

Bei Patienten mit Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür sollte der H. pylori-Status bestimmt werden. Für H. pylori-positive Patienten ist, wo immer möglich, eine Beseitigung des Bakteriums H. pylori durch eine Eradikationstherapie anzustreben. Vor der Behandlung von Magengeschwüren (Ulceri ventriculi) sollte durch geeignete Maßnahmen eine eventuelle Bösartigkeit ausgeschlossen werden

Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile. Bei schwerer Einschränkung der Nierenfunktion (Urämie, Dialyse-Patienten) sollte Sucrabet wegen des Aluminiumanteils nicht eingenommen werden.

Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Angaben in der Gebrauchsinformation.