



Freka-Clyss®

Gebrauchsfertiges Einmal-Klistier zur rektalen Anwendung; Humanpräparat

Zusammensetzung

100 ml enthalten:

Natriumdihydrogenphosphat 2 H ₂ O	16 g
Natriummonohydrogenphosphat 12 H ₂ O	6 g
in Wasser für Injektionszwecke	
p-Hydroxybenzoesäuremethylester	0,1 g
p-Hydroxybenzoesäurepropylester	0,01 g

Darreichungsform und Inhalt

120 ml Lösung zum rektalen Einlauf im gebrauchsfertigen Beutel mit 15 cm langem Einführungsschlauch.

Anwendungsgebiete

Bei Obstipation, zur raschen und nachhaltigen Entleerung des Enddarms vor Operationen, zur Vorbereitung von urologischen, röntgenologischen und gynäkologischen Untersuchungen oder Rektoskopien.

Gegenanzeigen

Freka-Clyss darf nicht bei Säuglingen, Kleinkindern und Kindern unter 12 Jahren angewendet werden. Die Anwendung bei Kindern kann zu schweren Komplikationen, auch mit tödlichem Ausgang führen, insbesondere sind dies Elektrolytstörungen, vor allem Hyperphosphatämie und Hypocalcämie sowie deren klinische Folgen wie Tetanie und Herzrhythmusstörungen.

Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Angaben in der Gebrauchsanweisung.